



抗濾過性病毒劑
Anti-Viral Agent
“永信”益冒[®]錠
(每艾普林諾)

Imin[®] Tablets
(Methisoprinol) “Yung Shin”

益冒錠主成分Methisoprinol係Inosine與Dimethylaminoisopropanol p-acetaminobenzoate 以1:3的分子比例所形成的合成化合物，為一種免疫促進物質，並具有抗濾過性病毒的作用。

【成分】 每錠中含：

Methisoprinol.....500mg

【作用】

1. 本藥經口投與後，由胃腸道迅速吸收進入血流之中而為細胞所攝取，能刺激免疫反應系統(Immune response system)，亦即促進「細胞形成性免疫反應」(Cell-mediated immune response)的自然增殖階段，和被活化T-淋巴球的抗病毒能力。
2. 本藥亦能增進抗體(Antibody)與淋巴動素(Lymphokines)的產生，選擇性地作用於受感染細胞導致其分解破壞，而對於正常細胞則有促進其正常新陳代謝的作用。

【適應症】

帶狀疱疹、麻疹症狀之緩解。

【用法用量】

成人：每次1 錠，每3-4小時一次。小孩：50mg/kg/day，分數次投與之。以上述劑量，服用至症狀消失後，仍需繼續投與1-2天。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

曾對本藥產生過敏反應之患者禁用之。

【一般注意】

1. 本藥可能會增加血清及尿液中之尿酸(uric acid)濃度，故對痛風、高尿酸血症或腎障害的病人，須慎重投與。
2. 本藥可與其他化學療法劑(例如：抗生素)同時投與，而無藥物配合禁忌。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授

乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

本藥耐受性良好，副作用(如，噁心、嘔吐)主要發生於大量服用之病例。此外，患者可能會發生血清及尿液中之尿酸(uric acid)濃度短暫上升現

【保存上之注意】

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 室溫15-30°C、避光儲存。
- 請在有效期限內使用。

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO.LTD.

公司地址：台中縣大甲鎮中山路一段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中縣大甲鎮日南里工九路27號